



## **Akcja informacyjna nt. afrykańskiego pomoru świń ASF**

### **Główny Lekarz Weterynarii przypomina**

Najczęstszym sposobem zakażenia świń wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest bezpośredni, a także pośredni kontakt z zakażonymi świniami i zakażonymi dzikami. Należy jednak pamiętać, że wirus ASF może łatwo rozprzestrzenić się za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, a także poprzez używanie sprzętu i narzędzi skażonych wirusem ASF, jak również za pośrednictwem zwierząt innych niż gospodarskie, mających dostęp do świń (np. gryzonie, psy, koty). Do zakażenia świń wirusem ASF może również dochodzić w wyniku skarmiania świń odpadami kuchennymi. Należy również pamiętać, że stosowanie skażonych pasz prowadzi do jego rozprzestrzeniania.

### **Rolniku!**

- nigdy nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia
- zabezpieczaj gospodarstwo przed dostępem dzików
- nigdy nie skarmiaj świń odpadami kuchennymi
- nie wprowadzaj na teren gospodarstwa osób postronnych

### **Pamiętaj!**

Jesteś Sąsiadem, bądź odpowiedzialny!

Zawsze stosuj zasady higieny w swoim gospodarstwie!

